SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas de empresas produtoras parceiras do IAPAR.
Confira os endereços em www.iapar.br.

Para evitar a perda da pureza genética e da resistência ao mosaico dourado, utilizar sempre sementes certificadas de IPR Celeiro.

Informações
www.iapar.br | comercial@iapar.br
(43) 3376-2482

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Agricultura e Abastecimento

IAPAR INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 Londrina - PR CEP 86047-902 (43) 3376-2000 www.iapar.br

NOVEMBRO/2016 - Reedição: 5.000 exemplares

FEIJÃO

IPR CELEIRO

OPÇÃO PARA CONTROLE DO MOSAICO DOURADO

IAPAR

Produtividade e lucro na safra de outono-inverno em regiões onde ocorre o mosaico dourado

RECONQUISTA

IPR Celeiro recupera a possibilidade de cultivar feijão na safra de outono-inverno (pós-culturas de verão) em grande parte das regiões produtoras do Brasil. É a reconquista de uma opção de renda retirada dos produtores pela ocorrência do vírus do mosaico dourado e de outros vírus transmitidos pela mosca branca.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

Planta

Hábito de crescimento: indeterminado tipo II
Porte: ereto, adequado para colheita mecânica
Comprimento da guia: curta a média
Ciclo médio da emergência ao florescimento: 38 dias
Ciclo médio da emergência à maturação: 87 dias

Grãos

Grupo comercial: carioca, bege-claro com listras marrom-claras
Forma: elíptica e semicheia
Brilho: opaco
Peso de mil sementes: 240 g

Reação a Doenças	R	MR	S
Mosaico comum (BCMV)	●		
Vírus que induzem deformações severas ou superbrotamento	●		
Mosaico dourado (BGMV)*		●	
Oídio		●	
Antracnose			●
Murcha bacteriana			●
Mancha angular			●

R: resistente; **MR:** moderadamente resistente; e, **S:** Suscetível.
*Resistência do tipo parcial: as plantas podem ser infectadas e apresentar sintomas da doença, mas sem perdas significativas na produtividade.

Potencial produtivo médio*

Sem incidência de mosaico dourado: 3.000 kg/ha
Sob incidência de mosaico dourado: 2.450 kg/ha

*Em condições experimentais, na safra de outono-inverno, no Estado do Paraná.

Indicação de Cultivo

IPR Celeiro é indicada para cultivo na safra de outono-inverno nas regiões produtoras dos Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, sujeitas à ocorrência do vírus do mosaico dourado, respeitando-se as recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

QUALIDADE CULINÁRIA E NUTRICIONAL

Tempo médio de cozimento: 22 minutos
Caldo: denso, de coloração marrom-clara
Teor médio de proteína: 22,5%

BOM DESEMPENHO NO CAMPO, NA PANELA E NO PRATO

IPR Celeiro é uma cultivar não transgênica, produtiva, adequada à colheita mecânica, de boa aceitação comercial e ótima qualidade culinária. Bem ao gosto do brasileiro, seu cozimento é rápido, com caldo denso e consistente. O resultado é um alimento nutritivo, com alto teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais.