

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 www.idrparana.pr.gov.br > Fale conosco

SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas de empresas produtoras parceiras do IDR-Paraná.

 www.idrparana.pr.gov.br/Cultivares-IPR

 comercial@idr.pr.gov.br

 (43) 99184-5992

 (43) 3376-2133 | 3376-2482

 Rod. Celso Garcia Cid, km 375
Londrina - PR



QUALIDADE CULINÁRIA E NUTRICIONAL

- Cozimento rápido: 20 minutos
- Caldo: marrom-claro/rosado
- Teor médio de proteína: 25%
- Teor médio de ferro: 8 mg/100 g
- Teor médio de zinco: 4 mg/100 g

INDICAÇÕES TÉCNICAS

- Cultivar de ciclo superprecoce que possibilita a semeadura do feijão da safra das águas na época indicada pelo zoneamento agrícola e posteriormente a semeadura de outra cultura de verão também dentro da época indicada
- Favorece a semeadura do feijão após o cultivo de verão, com menor risco de perdas por geadas
- Beneficia cultivos irrigados pela redução do custo de produção em virtude do ciclo reduzido
- Possibilita o escape às condições adversas à cultura, como ocorrência de pragas, doenças e déficit hídrico

Feijão

IPR CURIÓ

Bom desempenho agrônômico em condições de seca e altas temperaturas

Planta de porte ereto, adaptada à colheita mecânica direta

Ciclo superprecoce, favorecendo a inserção da cultura do feijão em diferentes sistemas de produção



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Hábito de crescimento: determinado tipo I
- Porte: ereto, favorecendo a colheita mecânica direta
- Cor da folha: verde-clara
- Altura média da inserção da primeira vagem: 16 cm
- Ciclo médio da emergência ao florescimento: 34 dias
- Ciclo médio da emergência à maturação de colheita: 70 dias
- Número médio de vagens por planta: 14 vagens
- Número médio de sementes por vagem: 5 sementes
- Comprimento médio das vagens: 10 cm
- Cor do grão: bege-claro, com listras marrons-claras
- Massa de mil sementes: 272 g

REAÇÃO A DOENÇAS E FATORES ADVERSOS

Doenças	Reação*
Ferrugem	Resistente
Oídio	
Mosaico comum	
Murcha de <i>curtobacterium</i>	Moderadamente resistente
Crestamento bacteriano	
Antracnose	Suscetível
Mancha angular	
Fatores adversos	
Seca	Intermediário
Altas temperaturas	

*Avaliações efetuadas no campo, em experimentos conduzidos nas safras das águas, seca e de outono-inverno em quatro anos agrícolas no Estado do Paraná.

INDICAÇÃO DE CULTIVO

Espaçamento entre linhas:

0,45 a 0,50 m - 12 a 13 plantas/m

População de plantas:

240 a 260 mil plantas/ha



POTENCIAL PRODUTIVO

3.892 kg/ha



ADAPTADO À COLHEITA MECÂNICA DIRETA

EXCELENTE QUALIDADE CULINÁRIA

GRUPO CARIOCA

CICLO SUPERPRECOCE

RESISTENTE AO ESCURECIMENTO DO TEGUMENTO