

RENDIMENTO DE GRÃOS*

Estado	Região	IPR Goitacá
PR	1	5.159
	2	5.532
	3	4.886
SC	1	6.553
	2	4.686
RS	2	5.236
SP	2	6.173
MS	3	3.008

*Rendimento médio de grãos (kg/ha) em ensaios, safras de 2018 a 2024.

TECNOLOGIA DE CULTIVO

Consultar a publicação *Informações técnicas para trigo e triticale*, organizada pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, disponível em www.reuniaodetrigo.com.br.

INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DE SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas de empresas parceiras do IDR-Paraná e da Fundação Meridional.

IDR-Paraná

 43 99184-5992
 comercial@idr.pr.gov.br
 www.idrparana.pr.gov.br

Fundação Meridional

 43 99923-2603
 meridional@fundacaomeridional.com.br
 www.fundacaomeridional.com.br



Conheça as cultivares do IDR-Paraná



FUNDAÇÃO MERIDIONAL



IDR-Paraná

Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

SETEMBRO/2025 - Tiragem: 3.000 exemplares

TRITICALE IPR GOITACÁ Produtividade e sanidade



IPR Goitacá foi desenvolvida pelo IDR-Paraná e avaliada em ensaios de VCU nas safras de 2018 a 2024, superando a produtividade média de grãos das testemunhas em todas as Regiões Homogêneas de Adaptação avaliadas. A cultivar destaca-se ainda pela tolerância à germinação na espiga e sanidade foliar e de espiga quando comparada às demais cultivares de triticales do IDR-Paraná.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Altura média da planta: 104 cm
- Ciclo: médio
- Espigamento médio: 64 dias
- Maturação média: 115 dias
- Acamamento: resistente
- Germinação pré-colheita: moderadamente suscetível

CARACTERÍSTICAS DOS GRÃOS


- Peso médio do hectolitro: 74 kg/hl
- Peso médio de mil grãos: 44 g

REAÇÃO A DOENÇAS

Ferrugem da folha	Moderadamente resistente
Ferrugem linear	Moderadamente suscetível
Manchas foliares	Moderadamente resistente
Oídio	Resistente
Brusone	Moderadamente suscetível
Giberela	Moderadamente suscetível
Nanismo amarelo da cevada	Suscetível

SUGESTÕES TÉCNICAS

- Densidade de semeadura: 300 a 350 sementes viáveis/m²
- Tratar sementes com inseticidas sistêmicos, visando o controle de pulgões
- Época de semeadura: consultar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para a cultura do triticales



Regiões de adaptação

- Paraná (PR): Regiões 1, 2 e 3
- Santa Catarina (SC): Regiões 1 e 2
- Rio Grande do Sul (RS): Região 2
- São Paulo (SP): Região 2
- Mato Grosso do Sul (MS): Região 3

- **Região 1:** fria e úmida
- **Região 2:** moderadamente quente e úmida
- **Região 3:** quente e moderadamente seca

Consulte sempre um engenheiro-agrônomo.

