

INDICAÇÃO DE CULTIVO

- Regiões mais quentes e menos sujeitas à ocorrência de geadas
- Consulte o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 www.idrparana.pr.gov.br > Fale conosco

SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas no IDR-Paraná.

 www.idrparana.pr.gov.br/Cultivares-IPR

 comercial@idr.pr.gov.br

 (43) 99184-5992

 (43) 3376-2133 | 3376-2482

 Rod. Celso Garcia Cid, km 375
Londrina - PR



IDR-Paraná

Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

JANEIRO/2022 - Tiragem: 2.000 exemplares

IPR LUZ DA MANHÃ

MARACUJÁ-AMARELO
(*Passiflora edulis Sims*)



IDR-Paraná
Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER

IPR Luz da Manhã é uma cultivar de maracujazeiro-amarelo do grupo azedo, composta de oito linhagens parentais que apresentam boa produtividade e qualidade de fruto superior.

FRUTOS*

Diâmetro:
75 mm

Comprimento:
90 mm

Formato:
oval

Acidez Titulável Total (ATT): 3,8%

Sólidos Solúveis Totais (SST): 12,5 °Brix

Tamanho:
4 A e Super


Massa do fruto: 220 g

Coloração da polpa: alaranjada

Rendimento da polpa: > 30%

Espessura da casca: 5,8 mm

Relação SST/ATT: 3,3



*Valores médios.



REAÇÃO A DOENÇAS E PRAGAS

Suscetível à bacteriose (*Xanthomonas axonopodis* pv. *passiflorae*), ao vírus do endurecimento dos frutos (*Cowpea aphid-borne mosaic virus* – CABMV) e às demais doenças e pragas que ocorrem na cultura.

POTENCIAL PRODUTIVO*

- Densidade de plantio: 1.666 plantas/ha
- 1º ciclo de produção: 30 t/ha (colheita do final de janeiro a julho)
- 2º ciclo de produção: 50 t/ha (colheita de meados de dezembro a julho)

*Avaliações realizadas nas regiões Norte, Noroeste e Litoral do Paraná. O segundo ciclo de produção é indicado apenas para áreas sem a ocorrência do CABMV.



ADAPTADO
às condições de solo e clima do **Paraná**



DUPLA APTIDÃO
fruta fresca e indústria



Boa opção de

CULTIVO
para pequenas propriedades



MUDAS E PLANTIO

Para regiões com a presença de CABMV, a altura da muda deve ser superior a 1,20 m (quatro a seis meses de idade) e formada em ambiente protegido com tela antiafídeos. A semeadura deve ser realizada no período de meados de março a meados de abril. No Paraná, em áreas com CABMV, recomenda-se o plantio em agosto/setembro (após um período de vazio sanitário de inverno), devendo o cultivo ser renovado anualmente.

IRRIGAÇÃO

A irrigação em regiões com deficiência hídrica contribui para o aumento da taxa de frutificação, o rápido desenvolvimento inicial das plantas e a antecipação da colheita, condição importante para a viabilidade econômica do modelo de produção de um ciclo.