



QUALIDADE INDUSTRIAL DOS GRÃOS

Porcentagem média de canjica	75% a 85%
Vitreosidade média do grão	92%
Peso hectolitro	81,8 g
Peso mil sementes (varia conforme peneira)	298 g

ÁREA DE RECOMENDAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 www.idrparana.pr.gov.br > Fale conosco

SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas, a partir da segunda safra 2026, de empresas produtoras de sementes licenciadas pelo IDR-Paraná.

 www.idrparana.pr.gov.br/Cultivares-IPR

 comercial@idr.pr.gov.br

 (43) 99184-5992

 (43) 3376-2133 | 3376-2482

 Rod. Celso Garcia Cid, km 375
Londrina - PR



Registro no RNC/MAPA: N° 55147



Milho Branco IPR W225

IPR W225 é um milho híbrido simples, de grãos brancos, que atende às exigências da indústria alimentícia. Apresenta alto rendimento industrial, excelente padrão de grãos e ampla adaptação na primeira e na segunda safra (safrinha). Por ser não transgênico, é uma opção para a demanda por grãos convencionais.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Híbrido simples
- Cultivar não transgênica
- Ciclo precoce
- Grãos brancos
- Grãos duros com vitreosidade acima de 90%
- Indicado para primeira e segunda safra, com ou sem consórcio com braquiária
- Alto potencial produtivo
- Alto rendimento industrial e baixo índice de grãos ardidos
- Indicado para canjica, fubá, farinha e amido
- Boa sanidade foliar e de espiga

INDICAÇÃO DE CULTIVO

Cultivar indicada para nível alto de tecnologia, podendo ser utilizada com ou sem consórcio com braquiária.



POPULAÇÃO DE PLANTAS

- Primeira safra: 60.000 a 65.000 plantas/ha
- Segunda safra (safrinha): 50.000 a 55.000 plantas/ha
- Espaçamento entre linhas: 45 cm a 80 cm

SUGESTÕES TÉCNICAS

COLORAÇÃO DOS GRÃOS

Para preservar a pureza e o padrão visual dos grãos brancos, recomenda-se isolamento:

- Físico: distância mínima de 300 m de outras lavouras de milho.
- Temporal: diferença mínima de 30 dias após a emergência (DAE) em relação a lavouras vizinhas.

MANEJO DE PRAGAS

- Monitoramento frequente da lavoura
- Cultivar de genética convencional (não GM), exigindo manejo integrado de pragas adequado ao sistema de produção

REAÇÃO A DOENÇAS FOLIARES


Cercosporiose	Moderadamente resistente
Enfezamento	
Ferrugem comum	
Mancha branca	
Podridão de grãos	
Ferrugem polysora	Moderadamente suscetível
Helmintosporiose	

DESEMPENHO PRODUTIVO

Desempenho produtivo na segunda safra (safrinha), no Paraná.



Desempenho produtivo na safra de verão, no Paraná.



Produtividade média geral, comparada ao benchmark atual (IPR 127), no Paraná.

