

QUALIDADE TECNOLÓGICA

Região	Força de glúten (W) (média)	Balanceamento de glúten (P/L) (média)
1	239	2,01
2	234	1,68
3	241	1,93

TECNOLOGIA DE CULTIVO*

Consultar a publicação Informações Técnicas para a Safra 2018: Trigo e Triticale, organizada pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. Cascavel: Coodetec, 2018.

*Consulte sempre um engenheiro-agônomo.

Procurando Sementes?

Acesse: www.fundacaomeridional.com.br

INFORMAÇÕES

IAPAR: (43) 3376 2482
www.iapar.br | comercial@iapar.br

Fundação Meridional: (43) 3323 7171
meridional@fundacaomeridional.com.br



FUNDAÇÃO MERIDIONAL
DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO



INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 Londrina - PR CEP 86047-902 (43) 3376-2000 www.iapar.br



Trigo Pão IPR Panaty

GRÃOS BRANCOS E ALTA PRODUTIVIDADE



FUNDAÇÃO MERIDIONAL



IAPAR

ABRIL/2019 - Reedição: 1.600 exemplares



Pães, biscoitos e massas integrais de **coloração clara** e **sabor suave**

Grãos	Panificação	Desempenho
› Brancos › Ovalados › Semiduros	› Industrial › Artesanal	› Alto rendimento › Precocidade › Ampla adaptação › Resistência ao acamamento

Desempenho

- Brancos
- Ovalados
- Semiduros
- Industrial
- Artesanal
- Alto rendimento
- Precocidade
- Ampla adaptação
- Resistência ao acamamento



REGIÕES DE ADAPTAÇÃO

- ▶ Paraná
- ▶ Santa Catarina
- ▶ São Paulo
- ▶ Mato Grosso do Sul

- Região 1: fria, úmida e alta
- Região 2: moderadamente quente, úmida e baixa
- Região 3: quente, moderadamente seca e baixa

- ▶ Paraná
- ▶ Santa Catarina
- ▶ São Paulo
- ▶ Mato Grosso do Sul

- Região 1: fria, úmida e alta
- Região 2: moderadamente quente, úmida e baixa
- Região 3: quente, moderadamente seca e baixa

Hábito de crescimento	Semiereto
Ciclo	Precoce
Porte	Baixo
Tempo médio para espigamento	63 dias
Tempo médio para maturação	112 dias
Altura média da planta	80 cm
Coloração das aurículas	Pouco colorida
Densidade de semeadura	300 a 350 sementes aptas/m ²
Época de semeadura	Preferencialmente a partir do meado da época indicada para a região

REAÇÃO A DOENÇAS E A FATORES ADVERSOS						
Doenças	MR	MS	Fatores adversos	MR	MSe	S
Ferrugem da folha			Debulha natural			
Manchas foliares			Acamamento			
Oídio			Alumínio do solo			
Giberela			Germinação pré-colheita			
Brusone						

Doenças	MR	MS
Ferrugem da folha		
Manchas foliares		
Oídio		
Giberela		
Brusone		

Fatores adversos	MR	MSe	S
Debulha natural			
Acamamento			
Alumínio do solo			
Germinação pré-colheita			

Estado	Região (VCU)	Rendimento médio (kg/ha)
Paraná	1	4.608
	2	4.547
	3	3.959
Santa Catarina	1	4.702
	2	3.556
São Paulo	2	4.003
Mato Grosso do Sul	3	3.367