AVEIA BRANCA FORRAGEIRA IPR SUPREMA

Excelência na produção de forragem de qualidade e ciclo supertardio

IAPAR

IPR SUPREMA

IPR Suprema é indicada para uso como forrageira visando a intensificação da produção animal a pasto e sistemas de integração lavoura-pecuária.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Apresenta ciclo de florescimento muito tardio (aproximadamente 145 dias), possibilitando a produção de forragem de qualidade por mais tempo, ampliando o período de pastejo/corte na estação fria e até a primavera, quando as forrageiras tropicais ainda não iniciaram o crescimento
- Teor de proteína bruta na folha: 20-23%
- Possui hábito de crescimento prostrado e altura média de 1,05 m no florescimento
- Excelente produção de matéria seca, alta capacidade de rebrota, excelente perfilhamento e ótima relação folha/colmo. Pode ser utilizada em cortes sucessivos mecanizados ou em até 8 ciclos de pastejo
- Ideal para sistemas de integração lavoura-pecuária, pois suas raízes profundas e abundantes auxiliam no condicionamento físico do solo
- Apresenta rendimento de sementes em torno de 900 kg/ha e peso médio de mil sementes de 22 gramas

REAÇÃO A DOENÇAS

- IPR SUPREMA é suscetível à ferrugem da folha e moderadamente resistente às manchas foliares
- Para controle da ferrugem deve ser realizado pastejo ou corte quando surgirem as primeiras pústulas na área foliar
- A infestação de pulgões pode transmitir virose (Vírus do Nanismo Amarelo da Cevada – VNAC) e prejudicar o rendimento de matéria seca e de sementes

RENDIMENTO FORRAGEIRO

(Três a seis cortes sucessivos até o florescimento)

Genótipo	Matéria seca (kg/ha)[1]	Porcentagem relativa
Aveia preta precoce	3.376	100
IAPAR 61	4.176	124
IPR 126	4.271	127
IPR Suprema	**4.431**	**135**

[1]Resultados médios adaptados* de dois anos, em quatro estados (RS, SC, PR e SP).

*Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras, 2013 - Análise Conjunta. In: Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, 34, 2014, Passo Fundo. **Anais...** Castro: Fundação ABC, 2014, 1 CD-ROM.

*Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras, 2014 - Análise Conjunta. In: Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, 35, 2015, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: UFGRS, 2015.

MANEJO DO PASTEJO

O primeiro pastejo deve ocorrer quando a aveia apresenta disponibilidade de 1,0 kg de matéria verde fresca por metro quadrado. A suspensão do pastejo da aveia IPR Suprema deve ocorrer quando a altura mínima atinge 8-15 cm de altura ou resíduo foliar de 20-25%.

RELAÇÃO FOLHA/COLMO

Genótipo	Proporção
Aveia preta precoce	1,5:1
IAPAR 61	2,7:1
IPR 126	4,4:1
IPR Suprema	**15,0:1**

SUGESTÃO DE SEMEADURA

Para produção de forragem

- Épocas de semeadura: abril e maio para as regiões Norte e Oeste do Paraná; de março a maio para a região Sul do Paraná e demais estados do Sul do Brasil
- Espaçamento: 0,17 m
- Densidade de semeadura: 280 sementes puras viáveis/m^2
- Gasto aproximado de sementes: 60 kg/ha

Para produção de sementes

- Épocas de semeadura: final de março a junho (semear no início do período em regiões com inverno mais seco)
- Espaçamento: 0,17 m
- Densidade de semeadura: 230 sementes puras viáveis/m^2
- Gasto aproximado de sementes: 50 kg/ha

SEMENTES

A cultivar está registrada no Registro Nacional de Cultivares (RNC/MAPA) sob o nº. 29.873.
Sementes podem ser adquiridas de empresas produtoras parceiras do IAPAR.

INFORMAÇÕES

www.iapar.br | comercial@iapar.br
(43) 3376-2482

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Agricultura e Abastecimento

IAPAR INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 Londrina - PR CEP 86047-902 (43) 3376-2000 www.iapar.br

DEZEMBRO/2016 - Tiragem: 5.000 exemplares