



PRODUTIVIDADE E QUALIDADE INDUSTRIAL

Em avaliações conduzidas pelo IDR-Paraná, nas safras de 2021 a 2025, em diferentes locais com predominância de solos arenosos, e em sistemas de cultivo com um ou dois ciclos de colheita, IPR Topázio apresentou produtividade média de 10% a 20% superior à cultivar IPR Paraguaína.

A renda de IPR Topázio varia de 500 g a mais de 600 g em amostras de 5 kg de raízes em água, dependendo da época de colheita.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 www.idrparana.pr.gov.br > Fale conosco

INFORMAÇÕES

 www.idrparana.pr.gov.br

 pololondrina@idr.pr.gov.br

 (43) 3376-2149

 Polo de Pesquisa e Inovação de Londrina
Rod. Celso Garcia Cid, km 375
Gleba Fazenda Palhano
CEP: 86.047-902 | Londrina – PR

 poloparanavai@idr.pr.gov.br

 (44) 3423-1157

 Polo de Pesquisa e Inovação de Paranavai
Rua Paulo Antônio da Costa, S/N
CEP: 87.701-970 | Paranavai – PR



Mandioca IPR TOPÁZIO



IPR Topázio é uma cultivar desenvolvida pelo programa de melhoramento genético de mandioca do IDR-Paraná, obtida a partir da cultivar Baianinha. Caracteriza-se pelo porte baixo das plantas e pela alta produtividade quando cultivada em condições ideais, com manejo adequado. É indicada principalmente para solos arenosos, em sistemas tecnológicos, sendo destinada à indústria de fécula e farinha.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Plantas de porte baixo
- Ramificação alta
- Material de propagação com média resistência ao armazenamento
- Raízes com casca marrom
- Colheita preferencialmente com um ciclo

REGIÕES DE CULTIVO

Centro-Sul do Brasil: Paraná (Noroeste e Oeste), São Paulo (Sudoeste) e Mato Grosso do Sul (Sul).



ADAPTABILIDADE EDAFOCLIMÁTICA

A cultivar IPR Topázio deve ser cultivada preferencialmente em solos arenosos, pois é moderadamente suscetível a podridões radiculares.

REAÇÃO A DOENÇAS

Antracnose	Moderadamente resistente
Bacteriose	
Superalongamento	
Podridões radiculares	Moderadamente suscetível